

●簡易懸濁可能医薬品一覧表 2026.3

2026/3/10

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
アイトロール錠20mg	トーアエイコー	条3	8 Fr.	○					92
アザルフィジンEN錠500mg	あゆみ製薬	適2	8 Fr.	×	×	○			94
アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○					IF
アスバラCA錠200	ニプロES	適3	8 Fr.	×	×	○			100
アスバラカリウム散50%	ニプロES	不適			悪				100
アスバラカリウム錠300mg	ニプロES	適3	8 Fr.	×	×	×	○		100
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	丸石	適1	8 Fr.						呉医療
アソセミド錠30mg「JG」	長生堂	適1	8 Fr.	○					106
アタラックスーPカプセル25mg	ファイザー	適1	8 Fr.	○					106
アドナ錠30mg	ニプロES	適1	8 Fr.	○					112
アトモキセチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	不適						メーカー回答は眼球刺激性のため不適だが、IFの試験結果からは8Fr.水(約55℃)5分で可能と思われる	メーカー、IF
アトモキセチン錠25mg「トーワ」	東和薬品	不適						〃	メーカー、IF
アトモキセチン錠40mg「トーワ」	東和薬品	不適						〃	メーカー、IF
アナフラニール錠10mg	アルフレツサファーマ	適2	8 Fr.	×	×	△	○		118
アナフラニール錠25mg	アルフレツサファーマ	適2	8 Fr.	×	×	△	○		118
アマリール錠1mg	サノフィ	適1	8 Fr.	○					118
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	適2	8 Fr.	×	△	×	○		126
アミティーザカプセル12μg	ヴィアトリス	適1	8 Fr.	×	○				インビューフォーム
アムバロ配合錠「サンド」	サンド	適1	8 Fr.	○					IF
アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	日本薬工	適1	8 Fr.	○					146
アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	日本薬工	適1	8 Fr.	○					146
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	日医工ファーマ	適1	8 Fr.	○					148
25mgアリナミンF糖衣錠	武田							8Fr. 14Fr.いずれも△ 破砕すれば投与可	東京医療
アリビプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					158
アリビプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					160
アリビプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					156
アリビプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					156
アルダクトンA錠25mg	武田	適1	8 Fr.	○					162
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品	適2	8 Fr.	×	×	○			164
アルブラゾラム錠0.4mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					166
アレンドロン酸錠35mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○				粘膜刺激性	168
アローゼン顆粒	サンファーマ	不適	8 Fr.		悪				170
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友	適2	8 Fr.	×	×	×	◎		170
アロプリノール錠100mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					172
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					176
イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	メディサ	条3	8 Fr.	×	◎			ポリスチレン製器具の溶解に注意。注入器・チューブへの付着量不明。カプセル残渣あり	178
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ファイザー	不適						徐放性	
イフェクサーSRカプセル75mg	ファイザー	不適						徐放性	
イミドール糖衣錠(25)	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					メーカー
イリボーOD錠5μg	アステラス	適1			○				呉医療
インヴェガ錠3mg	ヤンセン	不適						徐放性	
インヴェガ錠9mg	ヤンセン	不適						徐放性	
インチュニブ錠1mg	塩野義	不適						徐放性	200
インチュニブ錠3mg	塩野義	不適						徐放性	200
ウブレチド錠5mg	鳥居	適1	8 Fr.	○					202
ウラリット配合錠	ケミファ	適3	8 Fr.	×	×	△	○		202
ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	日本ジェネリック	適1	8 Fr.	○					202
エクセグラン錠100mg	大日本住友	適1	8 Fr.	△	○				204
エクメット配合錠LD	ノバルティス							病棟で破砕して投与可 (8Fr.△、14Fr.△)	東京医療
エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	東和薬品		8 Fr.					可(条件等の詳細不明)	東京医療
エスゾピクロン錠1mg「YD」	陽進堂	適1	8 Fr.	○				わずかにコーティングの残留物がみられる	メーカー
エスゾピクロン錠2mg「YD」	陽進堂	適1	8 Fr.	○				わずかにコーティングの残留物がみられる	メーカー
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.						東京医療
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ		8 Fr.					20mgカプセルでは、(最大で)10分放置すれば投与可	東京医療
エチゾラム錠0.25mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					210
エチゾラム錠0.5mg「SWJ」	メディサ	適1	8 Fr.	×	○				208
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「NikP」	日医工ファーマ	適1	8 Fr.	×	○				218
エビリファイ錠12mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	×	○				230
エビリファイ錠1mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	×	○				230
エビリファイ錠3mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	×	○				230
エフィエント錠3.75mg	第一三共	不適	8 Fr.	×	×	×	○	亀裂を入れ粗く砕いて8℃10分	メーカー

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
エブランチルカプセル15mg	科研	不適		—					230
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トール」	日医工	適2	8 Fr.	×	×	○			232
エリキウス錠2.5mg	BMS	適1	8 Fr.	○					234
Ｌ－アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	沢井	適3	8 Fr.	×	×	◎		吸湿性	234
エンシュア・H	アボット	適1						内用液	
エンシュア・リキッド	アボット	適1						内用液	
エンレスト錠100mg	第一三共	不適	14 Fr.	×	×	×	×		東京医療
エンレスト錠200mg	第一三共	不適	14 Fr.	×	×	×	×		東京医療
オーグメンチン配合錠 250RS	GSK	不適		×	×	—		吸湿性	242
オキシドリン徐放カプセル5mg「テルモ」	帝國製薬	不適						徐放性	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					252
オランザピンOD錠1.25mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					266
オランザピンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					264
オランザピンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					264
オランザピンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					262
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○	○				呉医療
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井	適3	8 Fr.	×	△(14分)	◎		直前コーティング亀裂で可(光に不安定)	286
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					288
ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
カルナクリン錠25 25単位	三和化学	不適						腸溶性、酵素製剤のため失活	メーカー
カルバマゼピン錠100mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					294
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					294
カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					296
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					298
カルボシステイン錠250mg「JG」	日本ジェネリック	適1	8 Fr.	×	○				300
コロナール錠200	あゆみ製薬	適1	8 Fr.	×	○				302
球形吸着炭細粒「マイラン」	マイラン	条1.3	10 Fr.		悪			2g。混合しながら注入。	316
クアゼパム錠15mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	×	○				316
クービックス錠25mg	塩野義	適1	8 Fr.	○					インタビューフォーム
クービックス錠50mg	塩野義	適1	8 Fr.	○					インタビューフォーム
クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeika	適2	8 Fr.	×	×	○			316
クエチアピン錠12.5mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					320
クエチアピン錠200mg「明治」	MeijiSeika	適2	8 Fr.	×	×	○			316
クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	×	○				316
クエチアピン錠50mg「明治」	MeijiSeika	適2	8 Fr.	×	×	○			324
ゲーフィス錠5mg	EAファーマ	適1	8 Fr.		○				呉医療
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	高田	適1	8 Fr.	×	○				330
グリチロン配合錠	ミノファージェン	適2	8 Fr.	×	×	○			1186
グルコンサンK細粒4mEq/g	サンファーマ	適1	8 Fr.		良				344
グルベス配合錠	キッセイ	適1	8 Fr.	○					346
クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	原沢	適1	8 Fr.	○					メーカー
クロザリル錠100mg	ノバルティス							データがないが、添加剤は一般的なものであるため懸濁液となると考えられる(クロザリルはほとんど水に溶けない)	メーカー
クロザリル錠25mg	ノバルティス							〃	メーカー
クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工サノフィ	適1	8 Fr.	○					東京医療
クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工サノフィ	適3	12 Fr.				○		東京医療
コートリル錠10mg	ファイザー	適1	8 Fr.	×	○				1142
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田	適1	8 Fr.	○					360
コレバインミニ83%	田辺三菱	不適			悪				360
コンサータ錠18mg	ヤンセン	不適						徐放性	
コンサータ錠27mg	ヤンセン	不適						徐放性	
コンサータ錠36mg	ヤンセン	不適						徐放性	
コントミン糖衣錠12.5mg	田辺三菱	適3	8 Fr.	×	×	○			360
コントミン糖衣錠25mg	田辺三菱	適3	8 Fr.	×	×	○			360
コントミン糖衣錠50mg	田辺三菱	適3	8 Fr.	×	×	○			360
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	健栄	適1	8 Fr.	○					372
シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱	適1	8 Fr.					内用液	
シクレスト舌下錠10mg	MeijiSeika	不適						舌下錠	376
シクレスト舌下錠5mg	MeijiSeika	不適						舌下錠	376
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	陽進堂	適1	8 Fr.	○					378
ジゴシン錠0.25mg	太陽ファルマ	適1	8 Fr.	○					380
ジスバルカプセル40mg	ヤンセン	適1	8 Fr.		○				メーカー
ジスロマック錠250mg	ファイザー	適1	8 Fr.	○					380
シナール配合錠	シオノギファーマ	不適		×	×	—		パントテン酸の分解	382

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂一水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
ジビリダモール錠25mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	△	○				メーカー
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	沢井	適1	8 Fr.	○					988
ジメチコン錠40mg「フソー」	扶桑	適1	8 Fr.	○					386
ジャスピア錠100mg	MSD	適1			○				anzu
ジャスピア錠50mg	MSD	適1			○				anzu
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	健栄	条1	10 Fr.		良				388
シロスタゾール錠50mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					398
スーグラ錠50mg	アステラス	適1	8 Fr.		○				東京医療
ストロメクトール錠3mg	MSD	適1	8 Fr.	○					408
スルピリド錠100mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	×	○				412
スルピリド錠50mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					412
精製水「ケンエー」	健栄	適1	8 Fr.					内用液	
セバゾン錠2	アルフレツサフーマ	適1	8 Fr.	○					418
セフトレニシボキシル錠100mg「OKJ」	大蔵製薬	適1	8 Fr.	○					メーカー
セリンクロ錠10mg	大塚製薬							データなし	メーカー
セルトラリン錠25mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					432
セルトラリン錠50mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					432
セレコシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー		8 Fr.					オーソライズド・ジェネリック、粉碎すれば投与可	呉医療
センノシド錠12mg「サント」	サント	不適		×	×	×	×		438
ゾーミグRM錠2.5mg	沢井		8 Fr.					何分で溶解かは不明だが、可	東京医療
ゾコーバ錠125mg	塩野義							データなし・メーカーは推奨していない(副作用報告あり)	メーカー
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	住友ファーマ	適1	8 Fr.	○					メーカー
ゾピクロン錠10mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	×	○				442
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	×	○				442
ゾフルーザ錠20mg	塩野義	適1	8 Fr.	○					444
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	日医工							データなし	メーカー
ダーブロック錠1mg	GSK							データなし	メーカー、呉医療
ダーブロック錠2mg	GSK		8 Fr.					可(懸濁時間の詳細は不明)	呉医療
ダイアモックス錠250mg	三和化学	適1	8 Fr.	○					452
ダイフェン配合錠	鶴原	適1	8 Fr.	○					452
タベジール錠1mg	日新	適1	8 Fr.	×	○				1232
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」	東和薬品	条3	8 Fr.	◎				OD錠	460
タルチレリンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	適1	8 Fr.	○					462
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	健栄	適1	8 Fr.		良				464
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	全星	不適		×	×	×	×	原薬強アルカリ、特異な味	466
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	全星	不適		×	×	×	×	原薬強アルカリ、特異な味	466
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					466
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					466
チアブリド錠25mg「サワイ」	沢井	不適			×				965
チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					470
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	メディサ	適2	8 Fr.	×	×	×	○		470
チラーヂンS錠50μg	あすか製薬	適2	8 Fr.	×	×	○			474
つくしA・M配合散	富士フィルム富山化学	不適						データないが不適と推測 (生薬末が繊維質、炭酸カルシウムが溶けない)	メーカー
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				476
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				478
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		やや悪				478
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				480
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				480
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				480
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				480
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				480
ツムラ小柴胡加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				1266
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		やや悪				480
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				482
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				1268

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				484
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		やや悪				486
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		やや悪				486
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				486
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				488
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				488
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ	適1	8 Fr.		良				488
デビゴ錠2. 5mg	エーザイ	適1	8 Fr.	○					東京医療
デビゴ錠5mg	エーザイ		8 Fr.					可(条件等の詳細は不明)	東京医療
テオロン錠100mg	エーザイ	不適		—				徐放性	492
テオロン錠200mg	エーザイ	不適		—				徐放性	492
デブロール錠50	MeijiSeika	適2	8 Fr.	×	×	○		苦み、舌にしびれ	498
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	ニプロ	不適						腸溶性	IF
デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	ニプロ	不適						腸溶性	〃
テルビナフィン錠125mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					504
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	ニプロES	適1	8 Fr.	○					516
ドグマチール細粒10%	アステラス	適1	8 Fr.		良				518
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg日医工	日医工ファーマ	不適		×	×				メーカー
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	適1	8 Fr.	○					532
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	適1	8 Fr.	○					524
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	適1	8 Fr.	○					526
トピナ錠50mg	協和キリン	適1	8 Fr.		○				呉医療
トフィンバム錠50mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					536
トフラニール錠10mg	アルフレツサファーマ	不適		×	×	—		着色	536
トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガー	適1	8 Fr.	○					東京医療
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	適2	8 Fr.	×	×	○			538
トラベルミン配合錠	エーザイ	適2	8 Fr.	×	×	○		苦味、舌のしびれ感	540
トラムセット配合錠	ヤンセン	適1			○				anzu
トランサミンカプセル250mg	第一三共	適1	8 Fr.	○					540
トリアゾラム錠0. 25mg「CH」	日本ジェネリック	適1	8 Fr.	×	○				542
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「CH」	長生堂	適1	8 Fr.	○				苦み	544
トリンテリックス錠10mg	武田	適1	8 Fr.	○					呉医療
トリンテリックス錠20mg	武田	適1	8 Fr.	○					東京医療
トルバプタンOD錠7. 5mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					メーカー
ナウゼリン錠5	協和キリン	適1	8 Fr.	×	○				552
ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品	条3	8 Fr.	○					564
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井	不適		×	×				566
ニトラゼパム錠5mg「TCK」	辰巳	適1	8 Fr.	○					568
ニトラゼパム錠10mg「JG」	日本ジェネリック	適1	8 Fr.	○					566
ニバジール錠2mg	LTL	適1	8 Fr.	○					568
ニバジール錠4mg	LTL	適1	8 Fr.	○					568
ニフェジピンCR錠10mg「三和」	三和化学	不適						徐放性	製剤特性
ニフェジピンCR錠20mg「三和」	三和化学	不適						徐放性	製剤特性
乳糖*(日興製薬)	日興製薬	適1	8 Fr.		良				574
ネオファーゲンC配合錠	大鵬薬品	適1	8 Fr.		○			5 Fr.も透過	メーカー
ノイロトピン錠4単位	日本臓器	不適	8 Fr.	×	×	—		吸湿で成分臭が増す	576
ノックピン原末	田辺三菱	不適			悪				576
パロデル錠2. 5mg	サンファーマ	不適		×	×			光に不安定	612
バイアスピリン錠100mg	バイエル	適3	8 Fr.	×	×	◎		胃腸障害注意。フィルムのかすが残るため細かく破壊	580
バキロビッドバック300	ファイザー							データなし	メーカー
バキロビッドバック600	ファイザー							データなし	メーカー

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	ファイザー	適2	8 Fr.	×	×	×	○		586
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					598
バルサルタン錠80mg「サンド」	サンド	適1	8 Fr.	○					メーカー
ハルシオン0.125mg錠	ファイザー	適1	8 Fr.	○					600
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永	適1	8 Fr.					内用液	
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	小林化工	適1	8 Fr.		良				602
バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	共和薬品	不適		—				徐放性	604
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	共和薬品	不適		—				徐放性	604
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	大日本住友	適3	8 Fr.				○		東京医療
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	大日本住友	適3	8 Fr.				○		東京医療
バロキセチン錠10mg「明治」	明治	適1	8 Fr.	○					604
バロキセチン錠20mg「明治」	明治	適1	8 Fr.	○					604
ハロベリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					612
ハロベリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					612
ハロベリドール錠1mg「タカタ」	高田							データなし	メーカー
ハロベリドール錠2mg「タカタ」	高田							データなし	メーカー
ハロベリドール錠3mg「ヨシトミ」	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					612
バントシン散20%	アルフレツサファーマ	条3	8 Fr.		良			懸濁しながら注入。多めの水で洗浄	616
バントシン錠200	アルフレツサファーマ	不適		×	×	×	×	吸湿性、光で分解	616
PL配合顆粒	シオノギファーマ	適1	8 Fr.		良				616
ビーゼットシー糖衣錠2mg	田辺三菱	適1	8 Fr.	×	○				628
ビオグリタゾン錠15mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					616
ピオスリー配合OD錠	東亜薬工	適1	8 Fr.		○				anzu
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	日本化薬	適1	8 Fr.	○					626
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	岩城	適1	8 Fr.					内用液	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					630
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」	武田テバファーマ	適2	8 Fr.	×	×	○			630
ビタダン配合錠	沢井	不適		×	×	×	×	有核錠	632
ヒダントールF配合錠	藤永	適1	8 Fr.	○					642
ヒダントール錠100mg	藤永	適1	8 Fr.	○					642
ヒダントール錠25mg	藤永	適1	8 Fr.	○					642
ビブレッソ徐放錠150mg	アステラス	不適						徐放性	
ビブレッソ徐放錠50mg	アステラス	不適						徐放性	
ビベリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					644
ヒベルナ糖衣錠25mg	田辺三菱				×		○	多めの残留物を認める	メーカー
ヒベルナ糖衣錠5mg	田辺三菱				×		○	少量の残留物を認める	メーカー
ビムバット錠50mg	UCB	適1							呉医療
ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品	適3	8 Fr.	×	×	◎		適否判定確認:わずかな苦味	648
ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品	適3	8 Fr.	×	×	◎		適否判定確認:わずかな苦味	648
ヒルナミン錠(50mg)	共和薬品	適3	8 Fr.	×	×	◎		適否判定確認:わずかな苦味	648
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					654
フィコンバ錠2mg	エーザイ	適1	8 Fr.	○					656
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」	陽進堂	適1	8 Fr.	○					662
フェノバル錠30mg	藤永	条3	8 Fr.	◎				苦味。多めの水で洗浄	662
フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	武田テバファーマ	適1	8 Fr.	×	○				664
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	×	○			オーソライズド・ジェネリック	メーカー(664)
フェロミア錠50mg	サンノーバ	適1	8 Fr.	×	○			吸湿性・光、鉄味(酸味)	666
フォシーガ錠5mg	アストロゼネカ							可(条件、Fr.の詳細不明)	呉医療
フォシーガ錠10mg	アストロゼネカ							可(条件、Fr.の詳細不明)	呉医療
フォリアミン錠	日本製薬	適1	8 Fr.	○					666
ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					670
ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					676
ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					676
フリバス錠50mg	旭化成ファーマ	適1	8 Fr.	○					680
フルイトラン錠2mg	シオノギファーマ	適1	8 Fr.	○					680
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					682
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					682
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	×	○				686
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	×	○				686
フルメジン糖衣錠(1)	田辺三菱	適1	8 Fr.	×	○				690
ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザーUPJ	適1	8 Fr.	○					828
ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザーUPJ	適1	8 Fr.	○					828
ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	武田テバ薬品	適1	8 Fr.		○				anzu
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ	適1	8 Fr.	×	○				690
フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ	適1	8 Fr.	○					694
フロセミド錠40mg「NP」	ニプロ	適1	8 Fr.	○					694

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	メディサ	適1	8 Fr.	○					694
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	DSPプロモ	適1	8 Fr.	○					呉医療
ブロナンセリン錠8mg「DSPB」	DSPプロモ	適1	8 Fr.	○					呉医療
プロマゼパム錠2mg「サント」	サント	適1	8 Fr.	×	○				702
プロマックD錠75	ゼリア	適1	8 Fr.	○				OD錠	702
ブロムペリドール錠1mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					702
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					702
ブロムペリドール錠6mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	○					702
ベオーバ錠50mg	杏林	適1	8 Fr.	○					メーカー
ベタニス錠25mg	アステラス	不適						徐放性	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ジェイドルフ	適1	8 Fr.	○					呉医療
ベルソムラ錠15mg	MSD	適2	8 Fr.				○		呉医療
ベルソムラ錠20mg	MSD	適2	8 Fr.				○		呉医療
ヘルベッサーRカプセル100mg	田辺三菱	不適		—				徐放性	722
ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	×	○				724
ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	×	○				724
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○				OD錠	728
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○				OD錠	728
ホスミン錠500	MeijiSeika	適1	8 Fr.	○					730
ボラブレンジンOD錠75mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					732
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	アステラス	適1	8 Fr.	○				ペースト状にし38～40℃の湯35mLで溶かす。チューブ内に残るためフラッシュ必要	メーカー
ホリゾン錠2mg	丸石	適1	8 Fr.	○					メーカー
ホリゾン錠5mg	丸石	適1	8 Fr.	○					メーカー
ポリフル錠500mg	ヴィアトリス	適3	14 Fr.	△	△	◎		固まるが振ると分散、放置ですぐに固まる	
ボンタールカプセル250mg	第一三共	不適		×	×			粉末が水に懸濁しない	736
マイスリー錠10mg	アステラス	適1	8 Fr.	○					738
マイスリー錠5mg	アステラス	適1	8 Fr.	○					東京医療
ミノマイシン錠50mg	ファイザー	適2	8 Fr.	×	×	○			748
ミヤBM細粒	ミヤリサン	適1	8 Fr.		○				東京医療
ミルタザピン錠15mg「明治」	MeijiSeika	適1	8 Fr.	△	○				メーカー
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	適1	8 Fr.	×	○				750
メコパラミン錠500μg「SW」	沢井	適1	8 Fr.	×	○				756
メジコン錠15mg	シオノギファーマ	適1	8 Fr.	○				苦み	758
メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	日医工	適1	8 Fr.	○					メーカー
メトグルコ錠250mg	大日本住友	適2					○		anzu
メトレキサート錠2mg「トーフ」	東和薬品	適1	8 Fr.	○					762
メトリジン錠2mg	大正製薬	適1	8 Fr.	○					766
メネシット配合錠100	オルガノン	適1	8 Fr.	○				※酸化マグネシウム、鉄剤との 配合変化に注意	915
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				OD錠	
メルカゾール錠5mg	あすか製薬	不適		×	×	×	×		768
モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					774
モニラック・シロップ65%	中外	適1	8 Fr.					内用液	
モビコール配合内用剤LD	EAファーマ							胃ろうのデータなし 溶解は30～40℃、1包あたり60mL	メーカー
モビコール配合内用剤HD	EAファーマ							胃ろうのデータなし 溶解は30～40℃、1包あたり60mL	メーカー
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田	適1	8 Fr.	○					786
ユリノーム錠25mg	トーアエイヨー	適1	8 Fr.	○					790
ユーロジン2mg錠	武田	適1	8 Fr.	△	○				792
ユベラ錠50mg	サンノーバ	不適		×	×			光	790
ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	興和	適1	8 Fr.					内用液	
ラダグノスNF経口ゼリー分包12g	三和化学	適1	8 Fr.	○				55℃10mLのぬるま湯の中にクラッシュ(袋の中で潰す)したゼリーを加え混ぜる。水で8 Fr.のチューブをフラッシュし前者を流す。再度、水でフラッシュしゼリーを押し流す。注)ゼリー状の塊がチューブ内に残ったままだと、徐々に粘度が高まりチューブ内の閉塞が起こることがある。	メーカー
ラゲブリオカプセル200mg	MSD							止むを得ない場合、脱カプセルして簡易懸濁。その際、手袋着用(僅奇形性あり)	
ラツダ錠20mg	大日本住友	適1	8 Fr.	○					東京医療
ラツダ錠80mg	大日本住友	適1	8 Fr.	○					東京医療
ラックビー微粒N	興和	適1	8 Fr.		○				東京医療
ラミクタール錠100mg	GSK	適1	8 Fr.	○					802
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	武田テバ	適2	8 Fr.				○		メーカー
ラモトリギン錠25mg「日医工」	日医工	適1	8 Fr.	○					804
ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	条3	8 Fr.	○				OD錠 水で崩壊、直ちに投与	806

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		
ランソプラゾールOD錠30mg「トール」	東和薬品	条3	8 Fr.	○				OD錠 水で崩壊、直ちに投与	806
リクシアナOD錠30mg	第一三共	適1	8 Fr.		○				呉医療
リクシアナOD錠60mg	第一三共	適1	8 Fr.		○				呉医療
リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	ヤンセン	適1	8 Fr.	○				OD錠	インタビューフォーム
リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星	適1	8 Fr.	○				OD錠	816
リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星	適1	8 Fr.	○				OD錠	816
リスベリドン内用液1mg/mL「杏林」	同仁	適1	8 Fr.					内用液	
リスモダンカプセル50mg	クリニジェン		8 Fr.					可(条件等の詳細は不明)	東京医療、(820)
リバーロキサパンOD錠10mg「バイエル」	バイエル	適1	8 Fr.	×	○			オーソライズド・ジェネリック	178
リバーロキサパンOD錠15mg「バイエル」	バイエル	適1	8 Fr.	×	○			オーソライズド・ジェネリック	178
リボトリール錠0.5mg	太陽ファルマ	適1	8 Fr.	△	○				826
リボトリール錠1mg	太陽ファルマ	適1	8 Fr.	△	○				826
リマプロスタールファデクス錠5μg「サワイ」	メディサ	適3	8 Fr.	×	△(15分)	×	○		828
ルジオミール錠25mg	サンファーマ	適1	8 Fr.	○					830
ルボックス錠25	アッヴィ	適2	8 Fr.	×	×	○		苦味、舌にしびれ	830
レキササティOD錠0.5mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	○				OD錠	メーカー
レキササティOD錠1mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	○				OD錠	メーカー
レキササティOD錠2mg	大塚製薬	適1	8 Fr.	○				OD錠	メーカー
レキソタン錠5	サンド	適1	8 Fr.	○					830
レグテクト錠333mg	日本新薬	不適						腸溶錠	
レグナイト錠300mg	アステラス	不適						徐放性	
レスプレン錠20mg	太陽ファルマ	適1	8 Fr.	○					832
レハミビド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬	適1	8 Fr.	○				オーソライズド・ジェネリック	メーカー
レベチラセタム錠250mg「トール」	東和薬品	適2	8 Fr.	×	○				インタビューフォーム
レベチラセタム錠500mg「トール」	東和薬品	適2	8 Fr.	×	○				インタビューフォーム
レボトミン錠25mg	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					840
レボトミン錠50mg	田辺三菱	適1	8 Fr.	○					840
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共エスファ	適1	8 Fr.	○				予め乳棒で4～5回叩く	メーカー
レミニール内用液4mg/mL	ヤンセン	適1	8 Fr.					内用液	
ロイコン錠10mg	大原	適1	8 Fr.	×	○				846
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	メディサ	不適		×	×	×	×	残渣あり	848
ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					868
ロドピン錠25mg	LTL	適1	8 Fr.	×	○				872
ロドピン錠50mg	LTL	条3	8 Fr.	×	◎				872
ロドピン錠100mg	LTL	条3	8 Fr.	×	◎				872
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					872
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					872
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	武田テバファーマ	適1	8 Fr.		○				874
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井	適1	8 Fr.	○					874
ロラタジンODフィルム10mg「モチダ」	持田							データなし	メーカー
ワーファリン錠1mg	エーザイ	適1	8 Fr.	○					880
ワソラン錠40mg	エーザイ	不適		×	×	×	×		880

商品名	会社名	適否	最小通過 サイズ	水(約55℃)		亀裂→水		備考	Handbook ページ等 (巻末参照)
				5分	10分	5分	10分		

凡 例

[適否]経管投与の適否を表す。

適1:10分以内に崩壊・懸濁し、経鼻チューブを通過する。

適2:錠剤のコーティングに亀裂を入れる。あるいはカプセルを開封すれば、10分以内に崩壊・懸濁し、8Fr経鼻チューブを通過。

適3:投与直前にコーティングに亀裂を入れれば使用可能

条1:条件付通過－チューブサイズにより通過の状況が異なる

条2:条件付通過－腸溶錠のためチューブが腸まで挿入されていれば使用可能

条3:条件付通過－備考欄参照

[水(約55℃)]薬品を約55℃のお湯20mLに入れ、5分または10分放置後に撹拌したときの崩壊状況。

■錠剤・カプセル剤

○:投与可能、◎:投与可能(適否判定参照)、×:投与困難、

△:時間をかければ完全崩壊しそうな状況。またはコーティング残留等によりチューブを閉塞する危険性がある崩壊状況、－:簡易懸濁法対象外

■散剤

良:溶解またはすぐに懸濁、やや悪:懸濁しにくい、悪:溶解・懸濁せず分散しない

[亀裂→水]錠剤・コーティングに亀裂を入れるまたはカプセルを開封した後に、約55℃のお湯20mLに入れ、5分または10分放置後に撹拌したときの崩壊状況。

■錠剤・カプセル剤

○:完全崩壊または注入器に吸い取り可能な崩壊状況、

◎:完全崩壊または注入器に吸い取り可能な崩壊状況(適否判定参照)、

×:投与困難な崩壊状況、

△:時間をかければ完全崩壊しそうな状況。またはフィルム残留等によりチューブを閉塞する危険性がある崩壊状況、

－:安定性により破壊できない錠剤

出典・情報源

※Handbookページ等(巻末参照)

・Handbook:内服薬 経管投与ハンドブック－簡易懸濁法可能医薬品一覧－(第4版)

・anzu:杏嶺会 簡易懸濁法使用薬剤表

・呉医療:呉医療センター採用医薬品 簡易懸濁可否一覧表

・東京医療:東京医療センター薬剤部 簡易懸濁法データベース

・メーカー:メーカー資料及びホームページ